



جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی

بیمارستان حضرت
فاطمه الزهرا
(س) مهریز
واحد ارتقا سلامت
کد سند: PA/Hp/58

نام و نام خانوادگی بیمار

سن بخشن

امضا بیمار

مهر و امضا پزشک

مهر و امضا پرستار

زمان مراجعه بعدی

- * در فواصل منظم و مشخص شده توسط پزشک و جهت ادامه درمان
- * در صورت درد شکم و ترشحات غیر طبیعی و علایم عفونت مجدد

رژیم غذایی

- صرف مایعات فراوان (روزانه حداقل 8 لیوان با گنجایش 240 سی سی آب بنوشید)
- صرف چای، قهوه، آب میوه شیرین، الکل را کاهش دهید.
- صرف میوه جات و سبزیجات

داروهای مصرفی

- ✓ در صورت تجویز آنتی بیوتیک، طبق دستور پزشک در فواصل معین و یک دوره کامل مصرف کنید.

طریقه مصرف	دارو

وضعیت حرکتی

- در صورت وجود تب استراحت کنید و بعد از بر طرف شدن تب باز می توانید فعالیت خود را آغاز کنید.
- ورزش منظم هوایی مثل پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا حداقل 30 دقیقه روزانه

پیگیری پس از ترخیص

- 12:30-9:30-7:30 ساعت 9:30-7:30 در صورت داشتن سوال

13:30 روزهای غیر تعطیل با واحد مراقبت در منزل(33162235) تماس بگیرید

مراقبت در PID

- ✓ پیش از مقاربت جنسی و بعد از آن ادرار کنید و دستگاه تناسلی را با آب و صابون ملایم بشوئید.
- ✓ در زمان احساس دفع ادرار سریع مثانه را تخلیه نمایید.
- ✓ بعد از اجابت مزاج موضع را از جلو به عقب تمیز کنید.
- ✓ از فرآورده های بهداشتی مخصوص دستگاه تناسلی (اسپری یا پودر) و صابون های قوی خودداری کنید زیرا پیشابرای و دستگاه تناسلی را تحریک می کند و محیط کشت مناسبی برای رشد باکتریها ایجاد میکند.
- ✓ لباس های زیر خود را از نوع نخی انتخاب کنید و از جوراب شلواری هایی که قسمت بالای آن نخی است استفاده کنید.
- ✓ لباس های زیر را بطور مرتب عوض کنید.
- ✓ از پوشیدن لباس زیر تنگ و نایلونی که منجر به افزایش رطوبت و گرما در ناحیه تناسلی میشود و زمینه را برای رشد میکروب فراهم میکند اجتناب کنید.
- ✓ بیش از ۳ دقیقه در حمام یا وان نمانید.
- ✓ بجای استفاده از وان از دوش استفاده کنید.