



دَوْلَةِ اِنْسَانِیَّتِ اِنْدَيْشِنِگِ نَهْرِ اَزْدَادِی
شَفَقَهِ اَنْدَادِی

بیمارستان حضرت
فاطمه الزهرا
(س) مهریز

واحد ارتقا سلامت
کد سند: PA/Hp/29

نام و نام خانوادگی بیمار

سن بخش

امضا بیمار

مهر و امضا پزشک

مهر و امضا پرستار

مراقبت در عفونت ادراری

پیگیری پس از ترجیح

- ✓ عدم استفاده از وان هنگام استحمام کردن.
- ✓ از فرآورده های بهداشتی مخصوص دستگاه تناسلی (اسپری یا پودر) و صابون های قوی خودداری کنید.

- ✓ در شرایط خاصی که شما با لوله و یا سوند ادراری مرخص میشوید. لطفاً قبل و پس از دست زدن به لوله ادراری و کیسه تخليه دستها را بشوئید.

- ✓ برای جلوگیری از آلدگی لوله ادراری را از کیسه تخليه جدا نکنید.

- ✓ ادرار درون کیسه تخليه را حداقل هر 8 ساعت یکبار و یا در صورت زیاد بودن حجم ادرار با فواصل کمتر تخليه کنید.
- ✓ از دست کاری لوله و کیسه تخليه خودداری کنید.

- ✓ لازم به ذکر است که تعویض یا در آوردن لوله ادراری باید توسط افراد با تجربه انجام شود تا از صدمه رسیدن به مجرای ادرار بیمار جلوگیری شود

در صورت داشتن سوال ساعت
- 12:30 و 9:30 - 7:30
روزهای غیر تعطیل با
واحد مراقبت در
منزل (33162235) تماس

✓ رعایت بهداشت فردی بویژه پس از اجابت مزاج و تعویض مرتب لباس زیر ضروری است.

✓ هیچ گاه ادرار کردن را به تاخیر نیاندازید.
✓ همیشه به درستی خودتان را تمیز کنید و از جلو به سمت عقب خود را بشویید تا باکتری ها وارد دستگاه ادراری نشوند. از اسپری و یا عطر زنانه در دستگاه تناسلی استفاده نکنید.

✓ از پوشیدن لباسهای تنگ و شورت های نایلونی برای مدت طولانی خودداری کنید.
✓ پیش از مقاربت جنسی و بعد از آن ادرار کنید و دستگاه تناسلی را با آب و صابون ملایم بشوئید.

✓ در زمان مشخص شده توسط پزشک اگر نیاز باشد بعد از درمان باید آزمایش ادرار را تکرار کنید تا مشخص شود که عفونت برطرف شده است. انجام کشتهای مکرر ادرار با فواصل معین در تمام دوره بارداری امری الزامی است تا از عدم بازگشت عفونت اطمینان حاصل شود.



جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی

بیمارستان حضرت
فاطمه الزهرا
(س) مهریز
واحد ارتقا سلامت

نام و نام خانوادگی بیمار

سن بخش

امضا بیمار

مهر و امضا پزشک

مهر و امضا پرستار

زمان مراجعه بعدی

مراقب علائم اولیه عفونت ها
باشد .
در صورت وجود خون در
ادرار، ادرار کدر، تب و لرز و
وجود خون و ترشحات چرکی
در ادرار به پزشک مراجعه
نماید.

وضعیت حرکتی

پس از بهبود علائم حاد
بیماری و افزایش قدرت
جسمانی فعایت های خود را
افزایش دهید و در برنامه
ریزی روزانه ورزش های ملایم
به همراه دوره های استراحت
بگنجانید .
حداقل 30 دقیقه و 5 بار در
هفته ورزش کنید.

داروهای مصرفی

در صورت تجویز آنتی بیوتیک
به مدت کافی دوره درمان را
کامل کنید (بسیاری از آنتی
بیوتیک ها را میتوان با
اطمینان در دوران بارداری
صرف کرد با تایید و نظر
پزشک)

نحوه استفاده	نام دارو

رژیم غذایی

- ✓ در طول روز زیاد مایعات بنوشید و از مصرف نوشیدنی های شیرین و آب میوه های شیرین پرهیز کنید و میزان توصیه شده 6-8 لیوان آب تصفیه شده در روز است.
- ✓ سعی کنید مصرف آلرژن ها، نگهدارنده ها و افزودنی های غذایی را کاهش دهید .
- ✓ به جای گوشت قرمز ، ماهی و سویا و لوبیا ها را به عنوان منبع پروتئین مصرف کنید .
- ✓ مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان مثل میوه هایی چون زغال اخته ، گیلاس و سبزیجاتی مانند کدو حلواهی و گوجه فرنگی را بیشتر مصرف کنید .
- ✓ مواد غذایی حاوی فیبر مثل لوبیا ، جو ، ریشه سبزیجات مثل سیب زمینی و دانه پسیلیوم (دانه گیاه اسفرزه) را بیشتر مصرف کنید .
- ✓ از مصرف زیاد مواد غذایی تصفیه شده مانند نان سفید ، پاستا و به ویژه شکر اجتناب کنید .
- ✓ روغن های پخت و پز سالم مثل روغن زیتون یا روغن سبزیجات را مصرف نمایید .
- ✓ مصرف اسیدهای چرب ترانس را در رژیم غذایی خود کاهش دهید یا در صورت امکان آنها را حذف کنید: این نوع اسیدهای چرب معمولاً در مواد غذایی پخته شده در صنایع غذایی مثل کلوچه ها، بیسکویتهای خشک نمکی، سیب زمینی سرخ کرده، مواد غذایی فرآوری شده و مارگارین وجود دارند.
- ✓ از مصرف قهوه و سایر محرک ها مانند الکل و تباکو، چای غلیظ پرهیز نمایید(الکل و کافئین با تحریک مثانه احتمال ابتلا به عفونت را افزایش میدهند)
- ✓ اجتناب از مصرف محرک هایی مثل سرکه و ادویه جات